

사용상의주의사항

1. 경고

수크랄페이트 현탁액의 부적절한 정맥 내 투여로 인해 폐 및 뇌색전증을 포함한 치명적인 합병증이 발생하였다. 이 약은 경구로만 투여하며, 정맥 내로 투여하지 않는다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

투석요법을 받고 있는 환자(장기투여에 의해 알루미늄 뇌증, 알루미늄 골(뼈)증이 나타날 수 있다.)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

신장애(신장장애) 환자(장기투여에 의해 알루미늄 뇌증, 알루미늄 골(뼈)증이 나타날 위험이 있으므로 정기적으로 혈중알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리포스파타제 등을 측정할 것.)

4. 부작용

1) 소화기계 : 때때로 변비, 구갈(목마름), 구역 드물게 설사, 구토, 소화불량, 복부(배 부분)팽만감 등이 나타날 수 있다.

2) 피부 : 드물게 가려움증, 발진이 나타날 수 있다.

3) 신경계 : 드물게 졸음, 현기(어지러움)가 나타날 수 있다.

4) 기타 : 드물게 요통, 두통이 나타날 수 있으며 과민반응(두드러기, 혈관부종(부기), 호흡곤란, 비염(코염) 등)의 보고가 있다.

5. 상호작용

1) 뉴퀴놀론계 항균제(염산시프로플록사신, 노르플록사신 등), 시메티딘, 라니티딘, 디 곱신, 페니토인, 테트라사이클린, 테오필린의 흡수를 저해(억제)할 수 있으므로 병 용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.

2) 이 약 투여에 의해 병용(함께 복용(사용))하는 약제의 흡수.배설에 영향을 줄 위험 이 있으므로 신중히 투여한다.

6. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃뚫, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유중으로 분비되는지 알려지지 않았으나 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성과 유효성이 확립되어 있지 않다.

9. 일반적 주의

1) 장기연용(계속 복용(사용))을 하지 않는다.

2) 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.